



Amputations digitales



RÉÉDUCATION

ORTHÈSE

Phase de cicatrisation cutanée	Phase de remodelage cicatriciel (cicatrice fermée)
<p><u>Buts thérapeutiques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lutte contre la douleur et les troubles vaso-moteurs - Prévention de la raideur <p><u>Techniques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tens (100hz), tonolyse (1hz), vibralgic, drainage digital, - Mobilisations passives et actives++ des articulations proximales <p><u>Risques :</u> SDRC si travail inadapté, douleur de membre fantôme, névrome...</p>	<p><u>Buts thérapeutiques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Récupération de la force et de l'amplitude - Assouplissement cicatriciel - Réintégration fonctionnelle - Réadaptation au froid <p><u>Techniques :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Idem + fluidothérapie, électrostimulations actives - Intensification des techniques articulaires et musculaires - Massages cicatriciels - Désensitization et matelassage du moignon (martelages) - Ergothérapie + réadaptation au froid (Lewis) <p><u>Risques :</u> Syndrome d'exclusion fonctionnelle</p>
<p>Orthèse de protection</p>	<p>Orthèse fonctionnelle (lycra-néoprène) si contact douloureux (avec sevrage progressif) – gants de soie (≠froid)</p>

J0 - J21

Après J 21

ESPACE MAIN

Clinique Aguiléra - 64200 – BIARRITZ

Tel : 05-59-22-47-44